

PHYTOLACCACEAE

Plantas dioicas o con flores hermafroditas, inermes o espinosas: árboles con tronco ensanchado en la base, sufrútices erguidos o trepadores, hierbas. Estípulas presentes o ausentes (espinas estipulares: [Sequieria](#)). *Hojas* alternas, frecuentemente largamente pecioladas. *Racimos*, espigas, tirsos o panículas. *Flores* : actinomorfas (zygomorfas : [Mohlana](#)). 4-5 sépalos. 4-8-30 (-n) estambres. Ovario súpero ; carpelo único o 7-10 parcialmente libres o soldados entre sí ; 1-10 estilos libres (sub)apical o estigma sécil papiloso. En las flores unisexuales (*P. dioica*) : estaminodios o pistilodios. *Bayas* globosas o esquizocárpicas ([Phytolacca](#)), achenios, sámaras unialadas o frutos secos alargados y uncinados ; perianto persistente. 7 géneros y 17 especies (?) en Paraguay.

Clave de los géneros [ir a las descripciones de los géneros](#)

1. Hierbas anuales con hojas frecuentemente lanceoladas. Flores muy pequeñas, en inflorescencias laxas, con ramas gráciles (sub)espícoformes. Estambres (6-7-) 8(-9). Achenios a veces equinulados.....[Microtea](#)
- 1a. Plantas diferentes.....2
2. Árboles inermes o espinosos, o arbustos trepadores espinosos con flores pentámeras.....3
- 2a. Sufrútices o hierbas perennes hermafroditas, siempre inermes4
3. Plantas espinosas (pares de espinas axilares): árboles o trepadores con flores hermafroditas. Sámaras. Panículas[Sequieria](#)
- 3a. Árboles dioicos inermes con tronco ensanchado en la base. Bayas comprimidas, casi esquizocárpicas. Racimos[Phytolacca dioica](#)
4. Espigas largas y delgadas de flores o frutos alargados. Frutos secos con el perianto persistente alargado, 4-6 uncinado. Flores tetrámeras, 4-8 estambres. Estípulas presentes.....[Petiveria](#)
- 4a. Racimos o tirsos de flores y frutos diferentes.....5
5. Varios carpelos. Bayas comprimidas, casi esquizocárpicas. Flores pentámeras. 10-30 estambres.....[Phytolacca](#)
- 5a. Un sólo carpelo. Flores tetrámeras, en racimos. Hierbas perennes o sufrútices erguidos o trepadores.....6

Phytolaccaceae

6. Flores zigomorfas, un sépalo más grande que los otros. Aquenio reticulado.....
.....Mohlana
- 6a. Flores actinomorfas. Baya7
7. Sufrútices trepadores. Estípulas. Estambres 8-12..... Trichostigma
- 7a. Hierbas o sufrútices erguidos. Estípulas ausentes. Estambres 4Rivina

Descripciones de los géneros [ir a las claves de los géneros](#)

Microtea

Hierbas con flores hermafroditas. Estípulas ausentes. Hojas alternas, frecuentemente lanceoladas. Inflorescencias laxas y gráciles, con ramas (sub)espícoformes. 5 sépalos. (6-7) 8 (-9) estambres. Ovario súpero ; 2 estigmas. Aquenio globoso, reticulado o equinulado, con el perianto persistente. 4 (?) especies en Paraguay.

Mohlana

Sufrútices o hierbas perennes con flores hermafroditas. Estípulas ausentes. Hojas alternas largamente pecioladas. Racimos. Flores zigomorfas. 4 sépalos (un sépalo más grande que los otros). 4 estambres. Ovario súpero unicarpelado; estigma sécil, papiloso. Aquenio globoso reticulado, con el perianto persistente. Una especie en Paraguay.

Petiveria

Sufrútices o hierbas perennes con flores hermafroditas. Estípulas. Hojas alternas. Espigas terminales muy largas. Flores sésiles, alargadas. 4 sépalos. 4-8 estambres. Ovario súpero unicarpelado; estilo sécil, papiloso. Frutos secos con el perianto persistente alargado y 4-6 uncinado. Una especie en Paraguay.

Phytolacca

Árboles dioicos con tronco ensanchado en la base, sufrútices o hierbas perennes con flores hermafroditas. Estípulas ausentes. Hojas alternas, largamente pecioladas. Racimos o tirsos terminales. 5 sépalos. 10-30 estambres. Ovario súpero ; carpelos 7-12, parcialmente libres o soldados entre sí; estilos 7-12, libres. En las flores unisexuales (P. dioica): estaminodios o pistilodios. Bayas deprimidas, casi esquizocárpicas, con el perianto persistente. 3 especies en Paraguay.

Phytolaccaceae

Rivina

Sufrútices o hierbas perennes con flores hermafroditas. Estípulas ausentes. Hojas alternas largamente pecioladas. Racimos. 4 sépalos. 4 estambres. Ovario súpero unicarpelado; estilo subapical. Bayas globosas con el perianto persistente. Una especie en Paraguay.

Seguiera

Árboles o lianas con flores hermafroditas. Espinas estipulares. Hojas alternas con puntuaciones. Panículas. 5 sépalos. Numerosos estambres. Ovario súpero unicarpelado; estilo comprimido. Sámara unialada, con el perianto persistente. Seis especies (?) en Paraguay.

Trichostigma

Sufrútices trepadores con flores hermafroditas. Estípulas. Hojas alternas largamente pecioladas. Racimos. 4 sépalos. 8-12 estambres. Ovario súpero unicarpelado; estilo sésil, papiloso. Bayas globosas con el perianto persistente. Una especie en Paraguay.